

Sykdommene barnet ditt tilbys vaksine mot

6 uker

Rotavirus (drikkevaksine) •
Tuberkulose (kun barn i risikogrupper)

0 (1) stikk

3 md

Rotavirus • Difteri • Stivkrampe •
Kikhoste • Poliomyelitt • Hib-infeksjon •
Hepatitt B • Pneumokokksykdom

2 stikk

5 md

Difteri • Stivkrampe • Kikhoste •
Poliomyelitt • Hib-infeksjon • Hepatitt B •
Pneumokokksykdom

2 stikk

12 md

Difteri • Stivkrampe • Kikhoste •
Poliomyelitt • Hib-infeksjon • Hepatitt B •
Pneumokokksykdom

2 stikk

15 md

Meslinger • Kusma • Røde hunder

1 stikk

Les mer: www.fhi.no/om-bvp



Før og etter vaksinasjon

Gi beskjed til helsesykepleier dersom

- barnet har allergi eller andre helseproblemer
- barnet nylig har fått medisiner eller andre vaksiner
- mor har fått medisiner som nedsetter immunforsvaret under svangerskapet og/eller mens hun ammer

Etter vaksinasjon bør man vente i 20 minutter før man forlater helsestasjonen.

De fleste barn får liten eller ingen reaksjoner etter vaksiner, men noen kan få milde og forbigående reaksjoner, som lett feber. Får barnet feber over 39 °C og/eller nedsatt allmentilstand, kan dette være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret for barnet.

Kombinasjonsvaksine

Kombinasjonsvaksine gir beskyttelse mot flere sykdommer i en og samme sprøyte. Flere av vaksinene i programmet gis på denne måten. Det innebærer færre stikk for barnet og gir mindre reaksjoner på stikkstedet enn når vaksinene blir gitt hver for seg.

Barnevaksinasjonsprogrammet i skolealder

I løpet av grunnskolen får barnet tilbud om oppfriskningsdoser av enkelte av vaksinene. På 7. trinn tilbys vaksine mot humant papillomavirus (HPV).

Oversikt over hvilke vaksiner barnet har fått

Alle vaksiner som barnet får, registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Oversikt over barnets vaksinasjoner finner du på Vaksinetjenesten på www.helsenorge.no

Spør gjerne helsesykepleier om du lurer på noe.